

مشتق:

تعریف: مشتق تابع $f(x)$ را در نقطه $x = a$ با $f'(a)$ نشان می‌دهیم و از یکی از دو رابطه زیر به دست می‌آید:

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

(۱) تعریف اول مشتق:

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{\tan x}{x} & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases}$$

(۲) تعریف اول مشتق: در تابع به معادله

(۴) وجود ندارد

• (۳)

- ۱ (۲)

۱ (۱)

پاسخ:

$$f'(x) = \begin{cases} x^2 \cdot \sin \frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

(۲) تعریف اول مشتق: در تابع به معادله

(۴) وجود ندارد

• (۳)

- ۱ (۲)

۱ (۱)

پاسخ:

(۳) تعریف اول مشتق تابع $f(x) = (x-1)(x-2)(x-3)$ در نقطه $x = 1$ کدام است؟

۴(۴)

۳(۳)

۲(۲)

۱(۱)

پاسخ:

$$y = (x^2 - 4) \operatorname{Arc sin} \sqrt{\frac{x+2}{x^2 + 4}}$$

(۴) مثال: مشتق تابع

تست ۵: مشتق تابع $y = (x^3 - 1)(x^3 - 2) \dots (x^3 - 10)$ به ازای $x = 3$ چقدر است؟

(۱) $6 \times 8!$ (۲) $-6 \times 8!$ (۳) $8!$ (۴) $-8!$

پاسخ: گزینه (۳)

$(x^3 - 9) \Rightarrow y'(x) = 2x \cdot (x^3 - 1)(x^3 - 2) \dots (x^3 - 10)$
 $\Rightarrow y'(3) = 6 \times (8 \times 7 \times \dots \times 1 \times -1) = -6 \times 8!$

تست ۶: اگر $f(x) = \sin x \cdot \sin \frac{x}{2} \cdot \sin \frac{x}{3} \cdot \sin \frac{x}{4}$ مقدار $f'(\pi)$ چقدر است؟

(۱) $\frac{1}{2}$ (۲) صفر (۳) $-\frac{\sqrt{6}}{4}$ (۴) $\frac{\sqrt{6}}{4}$

پاسخ:

تست ۷: اگر $f'(-1), f(x) = \frac{(x+1)h(x)}{(2x+1)h(2x+1)}$ چقدر است؟

(۱) -1 (۲) -2 (۳) 1 (۴) 2

پاسخ:

تست ۸: مشتق مرتبه دوم تابع $y = \frac{(x-1)^3 \cdot \operatorname{Arctg}(2x-1)}{\operatorname{Arcsin}(2x-1)}$ در $x = 1$ کدام است؟

(۱) ۹ (۲) ۲۷ (۳) ۱۸ (۴) ۳۶

پاسخ:

نکته:

مشتق راست $f'_+(a)$ در $x = a$: اگر تابع f در $x = a$ از راست پیوسته باشد آنگاه مشتق راست تابع f را در این نقطه با $f'_+(a)$ نشان می‌دهند و از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$f'_+(a) = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

مشتق چپ $f'_-(a)$ در $x = a$: اگر تابع f در $x = a$ از چپ پیوسته باشد آنگاه مشتق چپ تابع f را در این نقطه با $f'_-(a)$ نشان می‌دهند و از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$f'_-(a) = \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

تست ۹: مشتق چپ $f(x) = \sqrt{4+x[x]}$ در مبدأ کدام است؟

- $\frac{1}{2}$ (۴)

$\frac{1}{2}$ (۳)

- $\frac{1}{4}$ (۲)

$\frac{1}{4}$ (۱)

پاسخ:

شروط مشتق‌پذیری تابع در یک نقطه:

الف) f در $x = X$ پیوسته باشد.

$f'_-(x_+) = f'_+(x_+)$

نتیجه: اگر تابعی پیوسته نباشد آنگاه تابع مشتق‌پذیر هم نیست.

به همین ترتیب در صورت عدم وجود پیوستگی راست یا چپ قطعاً منحنی f در این نقطه دارای مشتق‌ات چپ و یا راست نخواهد بود.

نکته: در توابع چندضابطه‌ای تابع از هر طرف که پیوسته باشد می‌توان از آن مشتق گرفت.

مثال ۱۰: مشتق‌پذیری تابع $f(x) = \begin{cases} x^3 + 1 & x > 0 \\ x^2 & x \leq 0 \end{cases}$ بررسی کنید.

پاسخ:

تست ۱۱: تابع $f(x) = \begin{cases} x + \tan x & x > 0 \\ 1 & x = 0 \\ x - \tan x & x < 0 \end{cases}$ مشتق چپ ... و مشتق راست ...

(۴) ندارد - ندارد

(۳) ندارد - دارد

(۲) دارد - ندارد

(۱) دارد - دارد

پاسخ:

تست ۱۲: f ضابطه $f(x) = \begin{cases} ax + b & x < -1 \\ x^2 + a & x \geq -1 \end{cases}$ در \mathbb{R} مشتق‌پذیر است. b کدام است؟

-۳ (۴)

-۲ (۳)

۱ (۲)

۲ (۱)

پاسخ:

تست ۱۳: هر گاه تابع $y = |x| + ax[x]$ در مبدأ مشتق پذیر باشد مقدار a کدام است؟

۲(۴)

۱(۳)

۰(۲) صفر

-۱(۱)

پاسخ:

۲) تعریف دو مشتق:

نکته: مشتق چپ و راست:

$$f'_+(a) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

$$f'_-(a) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

مثال ۱۴: در تابع $f(x) = \sqrt{x}$ حاصل حدود زیر را محاسبه کنید:

۱) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h}$

۲) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+3h) - f(1)}{h}$

۳) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+7h) - f(1+7h)}{h}$

۴) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+4h) - f(1+4h)}{h}$

تست ۱۵: اگر $f(x) = \sqrt{1+x}$ باشد حاصل $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3-h) - f(3+h)}{h}$ کدام است؟

$-\frac{1}{2}(۴)$

$\frac{1}{2}(۳)$

-۱(۲)

۱(۱)

پاسخ: گزینه ۴ صحیح است.

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x-h) - f(x+h)}{h} \stackrel{\text{hop}}{=} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-f'(x-h) - f'(x+h)}{1} = -f'(x) - f'(x) = -2f'(x) = -\frac{1}{2}$$

$$\text{تسنیع: اگر } f'(x) \text{ کدام است؟} \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x-h)}{h} = 2\sqrt{x}$$

۲(۴) ۳(۳) ۴(۲) ۱(۳)

پاسخ:

$$\text{تسنیع: حاصل حد } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(\frac{\pi}{3} + h) - \sin(\frac{\pi}{3})}{h} \text{ کدام است؟} \quad \frac{1}{2}(۲)$$

۲(۴) ۱(۳) ۴(۲) ۱(۳)

پاسخ: با قاعده هوپیتال داریم:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(\frac{\pi}{3} + h) - \sin(\frac{\pi}{3})}{h} \stackrel{H}{=} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(\frac{\pi}{3} + h) - 0}{1} = \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$$

$$\text{تسنیع: حاصل حد } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(\frac{\pi}{3} + h) - \sin(\frac{\pi}{3} - h)}{h} \text{ کدام است؟} \quad \frac{1}{2}(۲)$$

۲(۴) ۱(۳) ۴(۲) ۱(۳)

پاسخ: گزینه «۳»

$$H = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(\frac{\pi}{3} + h) + \cos(\frac{\pi}{3} - h)}{1} = 1$$

$$\text{تسنیع: حاصل حد } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f''(x+h) - f''(x-\gamma h)}{\gamma h} \text{ کدام است؟} \quad f''(x)(1)$$

-f'''(x)(4) $\frac{1}{\gamma} f'''(x)(3)$ f'''(x)(3) f''(x)(1)

پاسخ: گزینه «۲» صحیح است.

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f''(x+h) - f''(x-\gamma h)}{\gamma h} \stackrel{\text{hop}}{=} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'''(x+h) + \gamma f'''(x-\gamma h)}{\gamma h} = f'''(x)$$

تست ۲۰: حاصل حد کدام است؟

$$\lim_{k \rightarrow \infty} k \left(\sin\left(x + \frac{\pi}{k}\right) - \sin\left(x + \frac{3\pi}{k}\right) \right)$$

-cos x (۱)	-sin x (۲)	cos x (۳)	sin x (۴)
------------	------------	-----------	-----------

پاسخ:

تست ۲۱: اگر $f'(x) = 4x + 6$ باشد حاصل $f''(x)$ کدام است؟

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f''(x + \delta h) - f''(x)}{h}$$

۴) صفر	-۱ (۱)	۲ (۲)	۱ (۳)
--------	--------	-------	-------

پاسخ:

$$H = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2 \times \delta \cdot f'(x + \delta h) \cdot f(x + \delta h)}{\delta} = 1 \cdot f(x) \cdot f'(x) = 4x + 6$$

$$\Rightarrow x = 1 \Rightarrow 1 \cdot f(1) \cdot f'(1) = 1 \cdot \Rightarrow f(1) \cdot f'(1) = 1$$

تست ۲۲: حاصل $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x^r + 1 - \sinh)^r - (x^r + 1)^r}{h}$ برابر است با:

-۴x(x^r + 1) (۱)	۴x(x^r + 1) (۲)	-۲(x^r + 1) (۳)	۲(x^r + 1) (۴)
------------------	-----------------	-----------------	----------------

پاسخ:

$$\sinh \sim h \Rightarrow \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x^r + 1 - h)^r - (x^r + 1)^r}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-r(x^r + 1 - h)}{1} = -r(x^r + 1)$$

مثال ۲۳: اگر $f(x) = \begin{cases} x^r + rx + r & x > 1 \\ rx & x \leq 1 \end{cases}$ باشد حاصل حدود زیر را بیابید:

۱) $\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(1 + rh) - f(1 - rh)}{rh}$

۲) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1 + h^r) - f(1 + rh^r)}{h^r}$

مثال ۲۴: اگر $f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x & x > 1 \\ 5x & x \leq 1 \end{cases}$ باشد حاصل حدود زیر را بیابید:

$$1) \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(1+h) - f(1-h)}{2h}$$

$$2) \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(1-h) - f(1-5h)}{h}$$

تسنیع: کدام است؟

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(2+3h) - f(2-5h)}{2h}$$

باشد حاصل $f(x) = \begin{cases} 3x+1 & x > 2 \\ 5x & x \leq 2 \end{cases}$

(۳) وجود ندارد $-\frac{16}{3}$ (۴) $\frac{3}{34}$ (۵) $\frac{34}{3}$ (۶)

$H = f'_+(2) + \frac{5}{3}f'_-(2)$ در $x = 2$ از راست ناپیوسته است پس مشتق راست ندارد و جواب وجود ندارد $\rightarrow f$

مثال ۲۵: اگر $f(x) = \begin{cases} 2x+1 & x > 1 \\ 5x & x \leq 1 \end{cases}$ باشد حاصل حدود زیر را بیابید.

تسنیع: کدام است؟

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(1-h) - f(1)}{2h}$$

باشد، حاصل حد $f(x) = \begin{cases} x^2 & x \geq 1 \\ x-1 & x < 1 \end{cases}$

$-\frac{2}{5}$ (۱) $\frac{2}{5}$ (۲) $-\frac{1}{5}$ (۳) $\frac{1}{5}$ (۴)

پاسخ: گزینه (۲)

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(1-h) - f(1)}{2h} = -\frac{1}{5}f'_+(1) = -\frac{1}{5}(2x)|_{x=1} = -\frac{2}{5}$$

تست ۲۸: در تابع $f(x) = \begin{cases} x^3 + 3x & x \geq 1 \\ x^3 - 3x + 6 & x < 1 \end{cases}$ کدام است؟

-۲ (۴) ۴ (۳) -۱ (۲) ۵ (۱)

پاسخ: گزینه «۲»

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1) - f(1-h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h \cdot f'(1-h)}{h} = f'_-(1)$$

پیوسته $x=1$ در $f \rightarrow f'_-(1) = 2x - 3 \Big|_{x=1} = -1$

تست ۲۹: هر گاه $f(x) = \begin{cases} \sin \pi x & : x \geq 1 \\ \cos \pi x & : x < 1 \end{cases}$ باشد حاصل کدام است:

-۱ (۴) π (۳) $-\pi$ (۲) ۱ (۱)

پاسخ: گزینه «۲» صحیح است.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^{\gamma} \left[f\left(1 + \frac{1}{n^{\gamma}}\right) - f(1) \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f\left(1 + \frac{1}{n^{\gamma}}\right) - f(1)}{\frac{1}{n^{\gamma}}} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = f'_+(1)$$

$$x > 1 \rightarrow f(x) = \sin \pi x \rightarrow f'_+(x) = \pi \cos \pi x \rightarrow f'_+(1) = -\pi \Rightarrow \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = -\pi$$

مثال ۳۰: دو نقطه به طول‌های 1 و h روی منحنی تابع $y = x^{1/5}$ قرار دارند. شب خط گذرنده بر دو نقطه وقتی $\rightarrow h$ را بیابید.

پاسخ:

تابع مشتق:

تابع g به معادله $g(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$ را تابع مشتق تابع f گفته که به صورت $y = f'(x)$ نیز نمایش می‌دهند. بدیهی است دامنه تابع مشتق f' نقاطی است که $f'(x)$ موجود می‌باشد. پس نقاطی که تابع در آنها مشتق‌پذیر نیست جزء دامنه تابع مشتق تابع f و یا به عبارت دیگر دامنه تابع f' نمی‌باشد.

نکته: علاوه بر (x, f') از نماد $\frac{dy}{dx}$ نیز استفاده می‌شود.

تست ۱۳: اگر $D_f = \sqrt{4x - x^2}$ کدام است؟

(۰, ۲] (۴)

(-۴, ۴) (۳)

(۰, ۴) (۲)

[۰, ۴] (۱)

پاسخ:

تست ۱۴: در تابع $f(x) = \begin{cases} x^2 \cdot \cos \frac{1}{x} & x \neq 0 \\ . & x = 0 \end{cases}$ دامنه $f'(x)$ کدام است؟

ϕ (۴)

$R - \{0\}$ (۳)

$R - \{0\}$ (۲)

R (۱)

پاسخ:

قواعد مشتق‌گیری:

١- مشتق توابع جبری

ردیف	تابع	مشتق
١	$y = c$	$y' = 0$
٢	$y = x$	$y' = 1$
٣	$y = x^n$	$y' = nx^{n-1}$
٤	$y = \sqrt[n]{x}$	$y' = \frac{1}{n\sqrt[n]{x^{n-1}}}$
٥	$y = u \pm v \pm \dots$	$y' = u' \pm v' \pm \dots$... تابعی از x هستند)
٦	$y = u \cdot v$	$y' = u' \cdot v + v' \cdot u$
٧	$y = \frac{u}{v}$	$y' = \frac{u'v - v'u}{v^2}$
٨	$y = u $	$y' = \frac{u'u}{ u } = \frac{u' u }{u}$
٩	$y = u^n$	$y' = nu^{n-1} \cdot u'$
١٠	$y = \sqrt[m]{u^n}$	$y' = \frac{nu'}{m\sqrt[m]{u^{m-n}}}$
١١	$y = \frac{k}{f}$	$y' = -\frac{kf'}{f^2}$

٢- مشتق توابع مثلثاتی

ردیف	تابع	مشتق
١	$y = \sin u$	$y' = u' \cos u$
٢	$y = \sin^m u$	$y' = mu' \cos u \sin^{m-1} u$
٣	$y = \cos u$	$y' = -u' \sin u$
٤	$y = \cos^m u$	$y' = -mu' \sin u \cos^{m-1} u$
٥	$y = \tan u$	$y' = u' (1 + \tan^2 u)$
٦	$y = \tan^m u$	$y' = mu' (1 + \tan^2 u) \tan^{m-1} u$
٧	$y = \cot u$	$y' = -u' (1 + \cot^2 u)$
٨	$y = \cot^m u$	$y' = -mu' (1 + \cot^2 u) \cot^{m-1} u$

۳- مشتق توابع معکوس مثلثاتی

ردیف	تابع	مشتق
۱	$y = \text{Arc sin } u$	$y' = \frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$
۲	$y = \text{Arc cos } u$	$y' = \frac{-u'}{\sqrt{1-u^2}}$
۳	$y = \text{Arc tan } u$	$y' = \frac{u'}{1+u^2}$
۴	$y = \text{Arc cot } u$	$y' = \frac{-u'}{1+u^2}$

مثال ۳۳: مشتق تابع $y = \frac{2x^5 + 7}{x^5 + 2}$ را در نقطه $x = 1$ بیابید.

 نکته: قبل از مشتق گیری تا جایی که ممکن است تابع را ساده کنید.

تست ۴۴: مشتق تابع $y = \text{Arctg}\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right) + \text{Arc Cotg}\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)$ برابر است با:

۴) صفر

$$\frac{\pi}{2} \quad (3) \quad \frac{1}{\sqrt{x}(1+x^2)} \quad (2) \quad \frac{1}{\sqrt{x}(1+x)} \quad (1)$$

پاسخ:

تست ۵۵: مشتق تابع به معادله $y = \frac{2x + 3\sqrt{x}}{2\sqrt{x} + 3}$ کدام است؟

$$\frac{x - \sqrt{x}}{(2\sqrt{x} + 3)^2} \quad (4)$$

$$\frac{1}{2\sqrt{x}} \quad (3)$$

$$\frac{12x}{(12\sqrt{x} + 3)^2} \quad (2)$$

$$\frac{1}{(2\sqrt{x} + 3)^2} \quad (1)$$

پاسخ:

تست ۳۶: اگر $f(x) = (x+1)(x^2+1)(x^4+1)(x^8+1)$ کدام است؟

-۱ (۴) ۱ (۳) ۵ (۲) ۱۵ (۱)
پاسخ:

تست ۳۷: مشتق تابع $y = \sin x \cdot \cos x \cdot \cos 2x$ برابر است با:

$\sin^4 x$ (۴) $\sin^4 x$ (۳) $\sin^4 x$ (۲) $\cos^4 x$ (۱)
پاسخ:

تست ۳۸: مشتق تابع $y = \frac{1 - \sin 2x}{\sin x - \cos x}$ عبارت است از:

$1 - \sin 2x$ (۴) $\frac{1}{(\sin x - \cos x)^2}$ (۳) $\sin x + \cos x$ (۲) $\sin x - \cos x$ (۱)
پاسخ: گزینه «۲»

$$y = \frac{(\sin x - \cos x)^2}{\sin x - \cos x} = \sin x - \cos x \Rightarrow y' = \cos x - \sin x$$

تست ۳۹: اگر $y'(\frac{\pi}{8})$ حاصل $y = \frac{-\tan^2 x + 2\tan x + 1}{1 + \tan^2 x}$ کدام است؟

۴) صفر $2\sqrt{2}$ (۳) $\sqrt{2}$ (۲) ۱) (۱)
پاسخ:

نکته: در برخی سوالات ممکن است حاصل یک عبارت دشوار خواسته شود در حالی که خود آن عبارت مشتق عبارت دیگری باشد. به سوالات زیر دقت کنید:

مسئله ۱۴: اگر $y = \sqrt[5]{x^3 - 2x}$ کدام است؟

$$2 - 3x^2 \quad (۲) \quad -5(3x^2 - 2) \sqrt[5]{(x^3 - 2x)^4} \quad (۱)$$

$$5(3x^2 - 2) \sqrt[5]{(x^3 - 2x)^4} \quad (۴) \quad 3x^2 - 2 \quad (۳)$$

پاسخ:

مسئله ۱۵: اگر $f'(1).g(1) + f(1)g'(1) = x + \sqrt{x^2 - x}$, $f(x) = x - \sqrt{x^2 - x}$ کدام است؟

$$\frac{1}{3} \quad (۴) \quad 1 \quad (۳) \quad \frac{1}{18} \quad (۲) \quad 1 \quad (۱)$$

پاسخ:

مسئله ۱۶: اگر u و v توابعی از x باشند و $\frac{u'}{v'} - \frac{u}{v} = 0$ آن گاه:

$$u.v \quad \text{ثابت است} \quad \frac{u}{v} \quad \text{ثابت است} \quad (۱)$$

$$u - v \quad \text{ثابت است} \quad u + v \quad \text{ثابت است} \quad (۳)$$

پاسخ:

مسئله ۱۷: اگر $f'(4)g(4) - g'(4)f(4) = 1$, $g(x) = \frac{1}{\sqrt{x - \sqrt{x^2 - x - 3}}}$, $f(x) = \sqrt{x + \sqrt{x^2 - x - 3}}$ کدام است؟

$$\frac{2 - \sqrt{7}}{\sqrt{7}} \quad (۴) \quad \frac{\sqrt{7}}{2} \quad (۳) \quad \frac{1}{2\sqrt{7}} \quad (۲) \quad \frac{\sqrt{7} - 2}{\sqrt{7}} \quad (۱)$$

$$k = f'(4)g(4) - g'(4)f(4) = g'(4)\left(\frac{f}{g}\right)'(4)$$

$$\frac{f}{g}(x) = (\sqrt{x + \sqrt{x^2 - x - 3}})(\sqrt{x - \sqrt{x^2 - x - 3}}) = \sqrt{x + 2}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+3}} \Rightarrow \left(\frac{f}{g}\right)'(4) = \frac{1}{2\sqrt{7}}, g(4) = 1 \Rightarrow k = \frac{1}{2\sqrt{7}}$$

مثال ۱۴: اگر $f(x) = \cos x \cdot \cos 2x \cdot \cos 4x$ کدام است؟

تسنیع ۱۵: اگر $V = \sqrt{x} \cos x$, $u = \sqrt{x} \cdot \sin x$ باشند، آن گاه $u' + vu'$ برابر است با:

$$\sqrt{x} \quad (۱)$$

(۲)

$$\frac{1}{\sqrt{x}} \quad (۳)$$

$$\frac{1}{2} \quad (۴)$$

پاسخ:

نکته: مشتق تابع مركب: اگر f تابعی مشتقپذیر باشد، داریم:

$$y = f(u) \Rightarrow y' = u'f'(u)$$

تسنیع ۱۶: اگر مشتق تابع $f(x)$ برابر با $\frac{1}{x}$ باشد آن گاه مشتق تابع $f(ax)$ کدام است؟

$$\frac{a}{x} \quad (۱)$$

$$\frac{1}{ax} \quad (۲)$$

$$\frac{a}{x} \quad (۳)$$

$$\frac{1}{x} \quad (۴)$$

پاسخ:

تسنیع ۱۷: اگر مشتق تابع $f(x)$ برابر باشد آن گاه مشتق $y = f(ax)$ کدام است؟

$$a \tan ax \quad (۱)$$

$$\tan x \quad (۲)$$

$$\tan ax \quad (۳)$$

$$a \tan x \quad (۴)$$

پاسخ: گزینه ۴ درست است. با توجه به قاعده مشتق تابع مركب داریم:

$$y' = (f(ax))' = \underbrace{f'(ax)}_{f'(u)} \cdot \underbrace{(ax)'}_{u'} = \tan ax \times a = a \cdot \tan ax$$

تسنیع ۱۸: اگر $x = \frac{1}{3} f(\frac{x}{3})$ آن گاه مشتق $f(x)$ در $x=3$ کدام است؟

$$\frac{1}{6} \quad (۱)$$

$$\frac{-1}{6} \quad (۲)$$

$$\frac{27}{2} \quad (۳)$$

$$\frac{-27}{2} \quad (۴)$$

پاسخ:

تست ۴۹: اگر $f'(x) = \frac{x+1}{\sqrt[4]{x^3+1}}$ باشد آن گاه مشتق تابع $f(\sqrt[4]{x})$ کدام است؟

$$\frac{1}{32}$$

$$\frac{1}{24}$$

$$\frac{1}{96}$$

$$\frac{1}{8}$$

پاسخ: گزینه «۴»

$$y = f(\sqrt[4]{x}) \Rightarrow y' = \frac{1}{4\sqrt[4]{x^3}} f'(\sqrt[4]{x}) \Rightarrow y'(16) = \frac{1}{32} f'(2) = \frac{1}{32} \times \frac{2+1}{\sqrt{9}} = \frac{1}{32}$$

تست ۵۰: اگر مشتق تابع $f(\sin x)$ برابر با $\cos^3 x$ باشد آن گاه مشتق تابع $f(x)$ کدام است؟

$$1 + \sin^3 x$$

$$1 - \sin^3 x$$

$$1 - x^3$$

$$1 + x^3$$

پاسخ:

تست ۵۱: اگر مشتق $f(\operatorname{tg} x)$ برابر باشد، آن گاه مشتق $f(\operatorname{Sin} x)$ کدام است؟

$$\frac{1 + \operatorname{tg}^3 x}{\operatorname{tg} x}$$

$$\cot g x$$

$$\operatorname{tg} x$$

$$(1 + \operatorname{Sin}^3 x) \operatorname{Cot} g x$$

پاسخ: گزینه «۱»

$$y = f(\operatorname{tg} x) \Rightarrow y' = (1 + \operatorname{tg}^3 x) f'(\operatorname{tg} x) = \frac{1 + \operatorname{tg}^3 x}{\operatorname{tg} x} \Rightarrow f'(\operatorname{tg} x) = \frac{1}{\operatorname{tg} x} \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{x}$$

$$\Rightarrow y = f(\operatorname{Sin} x) \Rightarrow y' = \operatorname{Cos} x f'(\operatorname{Sin} x) = \operatorname{Cos} x \frac{1}{\operatorname{Sin} x} = \operatorname{Cot} g x$$

تست ۵۲: اگر $f'(x) = 2$, $f(5x+1) + g(3x-2) = 2x^2$ در این صورت $(1) g'(x)$ کدام است؟

$$-1$$

$$-2$$

$$3$$

$$1$$

پاسخ:

تست ۵۳: اگر $f(x) = \sin(4x - f(x))$ و $f(0) = 0$ آن گاه $f(x)$ در $x = 0$ کدام است؟

$$-1$$

$$1$$

$$-2$$

$$2$$

پاسخ:

۵۴) تست: اگر g مشتقپذیر باشد و $g'(x) + g(2x) + \dots + g(nx) = nx$ کدام است؟

$$\frac{n+1}{2} \quad (۴)$$

$$\frac{n}{2} \quad (۳)$$

$$\frac{2}{n} \quad (۲)$$

$$\frac{2}{n+1} \quad (۱)$$

پاسخ:

۵۵) تست: اگر تابع f مشتقپذیر و همواره آن گاه $f'(3x - 2) + 2f(2 - 3x) = 9x$ کدام است؟

$$6(۴)$$

$$\frac{1}{3} \quad (۳)$$

$$3 \quad (۲)$$

$$-3 \quad (۱)$$

پاسخ:

۵۶) تست: اگر f پیوسته و مشتقپذیر باشد و $f''(x) + f(x^2) = 6x$ باشد $f'(1)$ کدام است؟

$$1(۴)$$

$$\frac{3}{4} \quad (۳)$$

$$\frac{2}{3} \quad (۲)$$

$$\frac{3}{2} \quad (۱)$$

پاسخ:

مشتق توابع شامل قدر مطلق:

برای محاسبه مشتق توابع شامل قدر مطلق در همسایگی یک نقطه ابتداعلامت عبارت داخل قدر مطلق را در اطراف نقطه داده شده بررسی کرده و قدرمطلق را از بین می بریم و در آخر مشتق می گیریم.

۵۷) تست: در تابع با ضابطه $|5 - x\sqrt{x}|$ $f'(x)$ مقدار $f'(4)$ کدام است؟

$$3(۴)$$

$$\frac{3}{2} \quad (۳)$$

$$\frac{1}{2} \quad (۲)$$

$$1) \text{ صفر}$$

پاسخ:

تست ۵۸: مشتق چپ تابع $|x| = \sqrt{5}$ در $x = 2x + |x|^2 - 5$ چقدر است؟

(۱) $2\sqrt{5}$ (۲) $-2\sqrt{5}$ (۳) $2 - 2\sqrt{5}$ (۴) $2 + 2\sqrt{5}$

پاسخ: گزینه «۳»

$$x \rightarrow \sqrt{5}^- \Rightarrow x^2 - 5 < 0 \Rightarrow f(x) = 2x + 5 - x^2 \Rightarrow f'(x) = 2 - 2x \Rightarrow f'(\sqrt{5}) = 2 - 2\sqrt{5}$$

تست ۵۹: مشتق تابع $y = |x| + |x+1| + \dots + |x+99|$ در $x = -\frac{9}{2}$ چه قدر است؟

(۱) -100 (۲) -90 (۳) 100 (۴) -100

پاسخ: گزینه «۱»

$$-\frac{9}{2} \text{ در همسایگی } \Rightarrow y = (-x - x - 1 - x - 2 - x - 3 - x - 4 + x + 5 + x + 6 + \dots + x + 99)$$

$$= 90x + k \Rightarrow y' = 90$$

تست ۶۰: اگر $f(x) = \left| (x-1)(x^2-9) \right|$ مفروض است حاصل $\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(3+h) - f(3)}{h}$ کدام است؟

(۱) 12 (۲) -6 (۳) 6 (۴) 12

پاسخ:

مشتق توابع شامل جزء صمیع:

الف: مشتق تابع به فرم $y = [f(x)]^n$ در نقاطی که مشتق پذیر باشد صفر است.

ب: هنگام مشتق‌گیری از توابعی به فرم کلی $f(x) = g(x)[h(x)]^n$ در نقطه‌ای به طول a (البته به شرطی که $h(a)$ صحیح نشود) دو راه وجود دارد.

(۱) از همان ابتدا $[h(a)]^n$ را که عدد صحیح می‌باشد، حساب کرده، سپس از تابع ساده شده، مشتق بگیریم و a را در آن قرار دهیم.

(۲) با جزء صحیح، مثل یک ضریب عددی برخورد می‌کنیم و از تابع مشتق می‌گیریم، سپس عدد a را در جواب، قرار می‌دهیم.

مثال ۶۱: مشتق تابع $y = x^{\frac{4}{3}}$ در $x = 0$ را به دست آورید.

پاسخ:

مثال ۴۶: مشتق تابع $y = x^{\frac{3}{2}} \left[x^2 \right]$ را در $x = 1$ به دست آورید.

پاسخ:

تسنیم ۳: اگر تابع $[x^r + ax + b].[x^s]$ در $x = 1$ دارای مشتق باشد $a+b$ کدام است؟

۴(۴)

-۳ (۳)

۲ (۲)

-۱ (۱)

پاسخ:

مشتقهای مراتب بالاتر :

تسنیم ۴: اگر تابع $f(x) = \begin{cases} ax^r + bx - c & x > 1 \\ |x - 1| + ax^s & x \leq 1 \end{cases}$ دو بار مشتق پذیر باشد. آن گاه $a-b+c$ کدام است؟

۲(۴)

-۱ (۳)

۱ (۲)

۰ (۰)

پاسخ:

تست ۴۵: تابع با ضابطه $f(x) = \begin{cases} x - \sin x & x \geq 0 \\ ax^n & x < 0 \end{cases}$ مشتق مرتبه سوم دارد. a کدامست؟

$$\frac{1}{3}(4)$$

$$\frac{1}{4}(3)$$

$$\frac{1}{6}(2)$$

$$\frac{1}{8}(1)$$

تست ۴۶: در تابع $f(x) = \begin{cases} |x^3| & x \neq 0 \\ . & x = 0 \end{cases}$ مشتق از کدام مرتبه به بعد در نقطه صفر وجود ندارد؟

$$4(4)$$

$$3(3)$$

$$2(2)$$

$$1(1)$$

پاسخ: گزینه «۳»

$$f(x) = \begin{cases} x^3 & x \geq 0 \\ -x^3 & x < 0 \end{cases} \Rightarrow f'(x) = \begin{cases} 3x^2 & x > 0 \\ -3x^2 & x < 0 \end{cases} : f'_+(\cdot) = 0 = f'_-(\cdot) \Rightarrow$$

مشتق اول دارد

$$f''(x) = \begin{cases} 6x & x > 0 \\ -6x & x < 0 \end{cases} \Rightarrow f'_+(\cdot) = 0 = f'_-(\cdot) \Rightarrow$$

مشتق دوم دارد

$$\Rightarrow f''' = \begin{cases} 6 & x > 0 \\ -6 & x < 0 \end{cases} : f'''_+(\cdot) \neq f'''_-(\cdot) \Rightarrow$$

مشتق سوم ندارد

نکته: مشتق n ام پند تابع معروف:

۱) مشتق n ام تابع $y = x^n$ برابر $y^{(n)} = n!$ و مشتق $(n+1)$ ام به بعد این تابع برابر صفر است.
مشتق مرتبه m ام آن از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$y = x^n \Rightarrow y^{(m)} = \frac{n!}{(n-m)!} x^{n-m}$$

۲) همواره مشتق $(4k)$ ام \cos و \sin خودش می‌شود.

۳) مشتق n ام تابع $y = \frac{1}{ax+b}$ از رابطه زیر محاسبه می‌شود.

$$y^{(n)} = \frac{(-1)^n \cdot n! \cdot a^n}{(ax+b)^{n+1}}$$

مثال ۷۴: مشتق هفدهم و هجدهم تابع f به معادله $f(x) = (x^3 - x + 1)^3 (x^2 - 6x + 1)^4$ را باید.

(۱) **تست ۶۸:** اگر $f(x) = (x+1)(x+2)(x+3)(x+4)$ چقدر است؟

۴) صفر

۶۴ (۳)

۸۴ (۲)

۷۲ (۱)

پاسخ:

$$f(x) = x^4 + (1+2+3+4)x^3 + \dots \Rightarrow f^{(4)}(x) = 4!x + 1 \times 3! \Rightarrow f^{(4)}(1) = 24 + 6 = 84$$

(۲) **تست ۶۹:** اگر $f(x) = \begin{cases} x^3 + 3x & x \geq 0 \\ x^2 + 3x & x < 0 \end{cases}$ کدام است؟

۴) وجود ندارد

۳) صفر

۴! (۲)

۳! (۱)

پاسخ:

(۳) **تست ۷۰:** مقدار مشتق مرتبه پانزدهم $y = \frac{\pi}{2^{14}} \sin 2x$ در x چقدر است؟

۲) ۴

۱ (۳)

-۱ (۲)

-۲ (۱)

پاسخ:

مثال ۷۱: مشتق مرتبه بیست و ششم تابع $y = \sin^2 x$ را باید.

(۱) $\frac{d}{dx} (\sin x)^{20} = 20 \sin^{19} x \cos x$ کدام است؟

$$\text{(۲)} \quad 20 \sin^{19} x \cos x \quad \text{(۳)} \quad -20 \sin^{19} x \cos x \quad \text{(۴)} \quad -20 \sin^{19} x \cos x$$

پاسخ: گزینه «۴»

$$\begin{aligned} f(x) &= 2\cos^2 x + \sin^2 x = (2\cos^2 x) + (\cos^2 x + \sin^2 x) = 2\cos^2 x + 1 = \cos 2x + 1 \\ \Rightarrow f^{(20)}(x) &= -20\cos 2x = 20(-2\sin^2 x - 1) \end{aligned}$$

(۱) $f(x) = \sin x + \cos x$ با کدامیک از مشتقات زیر برابر است؟

$$\text{(۱)} \quad \text{مشتق اول} \quad \text{(۲)} \quad \text{مشتق دوم} \quad \text{(۳)} \quad \text{مشتق سوم} \quad \text{(۴)} \quad \text{مشتق چهارم}$$

پاسخ: گزینه «۱»، مشتقهای مضارب ۴ تابع برابر خود تابع می‌باشد، بنابراین:

$$y^{(4n)} = y \Rightarrow y^{(56)} = y \Rightarrow y^{(57)} = y'$$

بنابراین مشتق پنجاه و هفتم تابع برابر مشتق اول تابع است.

مثال ۷۲: مشتق هفتم تابع $y = \frac{3x + \lambda}{x + 1}$ در نقطه $x = 0$ چقدر است؟

(۱) **۷۱۴:** اگر تابع $f(x) = (x^n + ax^m + bx + c)[x]$ در $x = 1$ دارای مشتق اول و دوم باشد، آن گاه $a + 2b + c$ کدام است؟

$$-2 \quad (۱)$$

$$2 \quad (۲)$$

$$-1 \quad (۳)$$

$$1 \quad (۴)$$

پاسخ:

۷۵) تست: اگر $y^{(n)}(\cdot)$, $y = (1 - \cos x)^{\frac{1}{n}} \cdot [x]$ موجود باشد بیشترین مقدار n چقدر است؟

۴) ۴

۳) ۳

۲) ۲

۱) ۱

آنکاه: مشتق تابع زوج یا فرد:

الف) اگر $f(x)$ تابعی مشتق پذیر و زوج باشد آنگاه مشتق f' , تابعی فرد خواهد بود.

ب) اگر $f(x)$ تابعی مشتق پذیر و فرد باشد؛ آنگاه مشتق f' , تابعی زوج خواهد بود.

۷۶) تست: هر گاه تابع f فرد باشد و داشته باشیم: $-2 = f'(-3) - f'(3)$ کدامست؟

۲) ۴

-۱) ۳

-۲) ۲

۱) ۱

پاسخ:

۷۷) تست: مشتق یازدهم تابع $y = \frac{1}{1-x}$ در $x=0$ کدام است؟

 $\frac{1}{11!} (4)$

۳) صفر

 $11! (2)$
 $\frac{1}{11!} (1)$

پاسخ:

$$\begin{cases} y'_x = -\frac{f'_x}{f'_y} \\ x'_y = -\frac{f'_y}{f'_x} \end{cases}$$

مشتق ضمنی: هر رابطه بین x و y که به صورت $f(x, y) = 0$ باشد، رابطه ضمنی نامیده می‌شود. در این روابط y'_x (مشتق y نسبت به x) و x'_y (مشتق x نسبت به y) از دو فرمول زیر محاسبه می‌شوند.

۷۸) مثال: مشتق تابع $\cos^x y = \sin^x y$ در نقطه $(\pi, 4)$ را به دست آورید.

پاسخ:

تست ۷۹: در رابطه ضمنی $\cos(x+y) + (x-y)^3 = \cos xy$ کدام است؟

- π (۱) $\frac{1}{\pi}$ (۲) -۱ (۳) ۱ (۴)

پاسخ: گزینه «۱» داریم . بنابراین: $\cos(x+y) + (x-y)^3 - \cos xy = 0$

$$y'_x = -\frac{f'_x}{f'_y} = \frac{-\sin(x+y) + 3(x-y)^2 + y \sin xy}{-\sin(x+y) - 3(x-y)^2 + x \sin xy}$$

$$\Rightarrow y'(\sqrt{\pi}, -\sqrt{\pi}) = -\frac{-\sin(0) + 3(4\pi) + (-\sqrt{\pi})\sin(-\pi)}{-\sin(0) - 3(4\pi) + (\sqrt{\pi})\sin(-\pi)} = 1$$

تست ۸۰: در رابطه ضمنی $x'y^3 = xy^3$ کدام است؟

- ۱۶۱ (۱) ۱۶۱ (۲) -۲۷ (۳) ۱۵۶ (۴)
۲۰ ۲۰ ۱۵۶ ۲۷

پاسخ:

تست ۸۱: در نمودار منحنی $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 4$ ، در کدام نقطه خط مماس بر نمودار منحنی موازی خط $y = -x$ است؟

- $x = 1$ (۱) $x = 4$ (۲) $x = \sqrt{2}$ (۳) $x = 2$ (۴)

پاسخ:

تست ۸۲: در رابطه ضمنی $\arcsin \frac{y}{x} = \frac{\pi}{2}$ کدام است؟

- $\pi - 1$ (۱) ۰ (۲) ۱ (۳) -۱ (۴)

پاسخ:

تست ۸۳: مشتق تابع $y = \sqrt{\sin x + \sqrt{\sin x + \sqrt{\sin x + \dots}}}$ بر حسب x کدام است؟

$$\frac{\cos x - y}{2y + 1} \quad (۱)$$

$$\frac{\cos x + y}{2y} \quad (۲)$$

$$\frac{\cos x}{2y} \quad (۳)$$

$$\frac{\cos x}{2y - 1} \quad (۴)$$

پاسخ:

تست ۸۴: مشتق تابع $y = \sqrt{x\sqrt{x\sqrt{x\sqrt{x\dots}}}}$ چقدر است؟

$$\frac{1}{2\sqrt{x}} \quad (۱)$$

$$\sqrt{x} \quad (۲)$$

$$1 \quad (۳)$$

$$0 \quad (۴)$$

پاسخ: گزینه «۲»

$$y = \sqrt{xy} \Rightarrow y' - xy = \cdot \Rightarrow y(y-x) = \cdot \Rightarrow y = x \rightarrow y' = 1$$

مثال ۸۵: در تابع $y = x^3 + y^3$ مطلوب است محاسبه y''_x .

پاسخ:

مشتق تابع معکوس:

$$(f^{-1})'(a) = \frac{1}{f'(f^{-1}(a))}$$

تست ۸۶: شیب خط مماس بر وارون تابع $y = x^3 + 2x - 1$ در نقطه‌ای به طول ۲ واقع بر تابع وارون کدام است؟

$$\frac{1}{16} \quad (۱)$$

$$16 \quad (۲)$$

$$\frac{1}{5} \quad (۳)$$

پاسخ:

تست ۸۷: اگر $f^{-1}(x) = x^3 - 3x$, $x > 1$ کدام است؟

۹(۴)

۳(۳)

 $\frac{1}{3}$ (۳) $\frac{1}{9}$ (۱)

پاسخ:

تست ۸۸: شیب خط مماس بر وارون تابع $y = \text{Arc sin}\left(\frac{x-1}{x+1}\right)$ در نقطه تقاطع آن با محور عرضها کدام است؟

 $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ (۴) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (۳)

۳(۳)

 $\frac{1}{3}$ (۱)

پاسخ: گزینه «۳»

تست ۸۹: اگر f تابعی در R مشتق پذیر و معکوس پذیر باشد و آنگاه $(f^{-1})'(x) = \sqrt{7-2f(x)+f^2(x)}$ کدام است؟

$$(f^{-1})'(\cdot) = \frac{1}{f'(f^{-1}(\cdot))} = \frac{1}{f'(1)} = \frac{1}{\left(\frac{(x+2)^2}{\sqrt{1-(\frac{x-1}{x+2})^2}}\right)_{x=1}} = 3$$

تست ۹۰: اگر f تابعی در R مشتق پذیر و معکوس پذیر باشد و آنگاه $f'(x) = \sqrt{7-2x+x^2}$ کدام است؟

 $\frac{\sqrt{7-2x+x^2}}{-1+2x}$ (۴) $\frac{-2+2x}{2\sqrt{7-2x+x^2}}$ (۳) $\frac{1}{\sqrt{7-2x+x^2}}$ (۱)

پاسخ:

تست ۹۱: تابع معکوس تابع $y = x^\delta + x^3 + 1$ در چند نقطه مشتق پذیر نیست؟

۳(۴)

۲(۳)

۱(۲)

۱) صفر

پاسخ:

مشتق های فاصله:

تیپ ۱:

تست ۹: اگر $y'_x = \sin 2x$, $y = 2u^3 - u$ باشد، آن گاه $x = \frac{\pi}{6}$ در

$$2\sqrt{3} - 1 \quad (4)$$

$$3\sqrt{2} + 1 \quad (3)$$

$$3\sqrt{2} - 1 \quad (2)$$

$$2\sqrt{3} + 1 \quad (1)$$

پاسخ:

تیپ ۲:

تست ۱۰: مشتق تابع $y = x^3 - 2x^2$ نسبت به $x = 1$ کدام است؟

$$2x \quad (4)$$

$$\frac{3}{2}x - 2 \quad (3)$$

$$x - 1 \quad (2)$$

$$\frac{1}{2}x + 1 \quad (1)$$

پاسخ:

تست ۱۱: هر گاه $f'_{\sin x}$ باشد حاصل $f(x) = \sin x - \cos x$ کدامست؟

$$\cot gx - 1 \quad (4)$$

$$\operatorname{tg} x \quad (3)$$

$$1 + \cot g x \quad (2)$$

$$1 + \tan x \quad (1)$$

پاسخ:

$$\begin{cases} f(x) = \sin x - \cos x \rightarrow f'(x) = \sin x + \cos x \\ g(x) = \sin x \rightarrow g'(x) = \cos x \end{cases} \Rightarrow f'_{\sin x} = \frac{\sin x + \cos x}{\cos x} = \tan x + 1$$

تیپ ۳:

تست ۱۲: شیب خط مماس بر تابع $\begin{cases} x = \sin \theta - \cos \theta \\ y = \tan \theta - \cot g \theta \end{cases}$ به ازاء $\theta = \frac{\pi}{4}$ کدامست؟

$$4\sqrt{2} \quad (4)$$

$$2\sqrt{2} \quad (3)$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2} \quad (2)$$

$$\sqrt{2} \quad (1)$$

پاسخ:

$$\text{مثال ۹۱۴: در تابع } \begin{cases} x = t^2 - 1 \\ y = t^4 - 1 \end{cases} \text{ مطلوب است محاسبه } y'(2)$$

پاسخ: چون y' خواسته شده، پس $t^2 - 1 = 2$ و از آن جا $t^2 = 3$ پس
حال مشتق تابع را در $t = \pm\sqrt{3}$ محاسبه می‌کنیم.

$$y'_x = \frac{y'_t}{x'_t} = \frac{4t^3}{2t} = 2t^2 \xrightarrow{t=\pm\sqrt{3}} y'_x(2) = 12$$